

LOS DOS MÉTODOS DE ABORTO

	INSTRUMENTOS MÉDICOS	MEDICAMENTOS
Edad gestacional*	Hasta 14,6 semanas	Hasta 10 semanas
Costo	Gratuito con la Carte d'assurance maladie	Gratuito con la Carte d'assurance maladie
Técnica	Dilatación, aspiración	Mifepristona: interrupción del embarazo Misoprostol: eliminación del producto del embarazo
Lugar	Procedimiento efectuado en el Centro	Consulta médica en el centro, y después eliminación en la casa
Tasa de eficiencia	99%	+/- 95%
Consulta	Una sola consulta de 2 a 3 horas	Un consultas obligatoria : 1h30 seguimiento telefónico : 15 min
Duration	Intervención : 5 a 10 minutos	Eliminación del producto del embarazo: duración diferente según la mujer, sucede entre 30 min y 6 h después de haber ingerido el misoprostol
Dolor	Contracciones de intensidad ligera a moderada, raramente severa, durante la intervención	Contracciones de intensidad moderada a severa durante la expulsión
Alvio del dolor	Controlado con medicamentos por vía intravenosa. Posible ajuste de la dosis durante la intervención	Controlado con medicamentos comprimidos. No hay posibilidad de ajuste en las dosis
Sangrados	Menos abundantes que las menstruaciones, duración promedio de alrededor de una semana	Más abundantes que las menstruaciones, duración promedio de 10 a 16 días
Acompañamiento	Obligatorio para el regreso a casa	No es obligatorio

* Si está embarazada de 15 semanas o más, será remitida a otra clínica.

INESSS, L'interruption volontaire de grossesse pratiquée à l'aide du Mifegymiso, février 2017
Clinical practice guideline, medical abortion, SOGC, NO. 332, April 2016